

## التنبهات الزراعية Avertissements agricoles

المعهد الوطني لوقاية النباتات

م. بوعن. 12 نهج الأخوة وادك حسن  
بادي - ص. ب. 80 الحراش - الجزائر

DEPARTEMENT D'APPUI TECHNIQUE

☎ : 023.82.88.86  
☎ : 023.82.88.96  
@ : www.inpv.edu.dz

دائرة الدعم التقني

☎ : 023.82.88.86  
☎ : 023.82.88.96



## ROUILLES DES CEREALES

11/04/2017



Les précipitations ayant touchées les régions du nord durant cette période, suivies d'un adoucissement progressif des températures journalières, favorisent la dissémination de foyers de rouille jaune, déclarés à Tlemcen et Alger ainsi que la rouille brune, décelée à Boumerdés et Tipaza sur différentes variétés des blés cultivés.

Le risque de développement et de dissémination de ces deux maladies fongiques à caractère épidémique, est très élevé notamment dans les régions ayant déjà connu ce problème auparavant.



A cet effet, nous conseillons vivement les céréaliculteurs dont les parcelles présentent des symptômes d'attaque, de procéder à un traitement fongique adéquat.

Les autres céréaliculteurs sont invités à accentuer leur vigilance et en particulier au niveau des champs cultivés en variétés sensibles et se tenir prêt à intervenir préventivement dès l'apparition des premières pustules, par l'application d'un fongicide spécifique et homologué.

**Pour plus d'informations, veuillez-vous rapprocher des services phytosanitaires régionaux.**

## التنبهات الزراعية Avertissements agricoles

المعهد الوطني لوقاية النباتات  
م. و.ع. 12 نهج الأخوة وادك حسن  
ب.دي - ص.ب. 80 الحراش - الجزائر

### DEPARTEMENT D'APPUI TECHNIQUE

☎ : 023.82.88.86  
☎ : 023.82.88.96  
@ : www.inpv.edu.dz



### دائرة الدعم التقني

☎ : 023.82.88.86  
☎ : 023.82.88.96

## الصدأ على محاصيل الحبوب 2017/04/11



ان الامطار التي مست ولايات الشمال خلال هذه الفترة، كانت مصحوبة باعتدال تدريجي في درجات الحرارة اليومية، قد تكون ملائمة لانتشار الصدأ الأصفر الذي ظهر بولايتي تلمسان و الجزائر و الصدأ البني الذي تم الكشف عنه بولايات الجزائر، تيبازة و بومرداس على مختلف انواع القمح.

قد يزداد خطر الإصابة و انتشار هذه الامراض ذات الطابع الوبائي على محاصيل الحبوب في المناطق التي عرفت الإصابة بها مسبقا.



لهذا الغرض ندعوا منتجي الحبوب الذين ظهرت عندهم هذه الامراض بالقيام بمعالجة فطرية. أما بالنسبة للآخرين، ننصح منتجي الحبوب بالمراقبة بصفة دائمة خاصة الأصناف الحساسة منها لهذه الأمراض و التحضير للمعالجة الوقائية بمجرد ظهور الأعراض الأولى و هذا باستعمال مبيد فطري ملائم ومرخص.