






Ministère de l'Agriculture du Développement Rural et de la Pêche





INSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX






DEPARTEMENT D'APPUI TECHNIQUE



Bulletin Phytosanitaire Hebdomadaire N°23 Du 27/02 au 05/03/2017

Régions Données météorologiques	Temps 	Température 	Vent 
Régions Nord	Temps généralement brumeux en début de matinée puis ensoleillé durant la journée sur les régions de l'Ouest, Est et Centre (littoral et hauts plateaux). Quelques passages nuageux peuvent avoir lieu sur les régions du Nord,	Les températures maximales caractérisant cette semaine seront douces variant entre 16 et 20°C sur les régions côtières. Vers l'intérieur, les Hauts plateaux et les Aurès, elles oscilleront entre 12 et 16°C. Une légère hausse sera enregistrée à partir de jeudi (22°C).	Les vents seront modérée près des côtes à faibles sur les régions de l'intérieurs et des Hauts plateaux
Régions Sud	Le temps sera généralement dégagé et parfois voilé sur les régions du Nord, Centre et Extrême Sud du Sahara.	Les températures maximales oscilleront entre 18 et 24°C sur les régions du Nord Sahara et les Oasis. Vers le centre du Sahara, elles oscilleront entre 24 et 28°C. A l'Extrême sud, les températures peuvent atteindre 34°C.	Les vents seront faibles à modérés pratiquement sur l'ensemble des régions du Sahara en allant du Nord jusqu'au Sud.

Spéculations	Régions	Stades phénologiques	Risques	Signalisations de la semaine	Recommandations
Agrumes 	Centre Ouest Est	- Repos végétatif (variétés précoces) - fin récolte (variétés tardives)	Gommose		<ul style="list-style-type: none"> • Entretien des vergers récoltés. • Traitement d'hiver à réaliser, de préférence, juste après la taille et avant le débourrement.
Olivier 	Centre Ouest Est Sud	- Repos végétatif	Tavelure Psylle	—	
Céréales 	Centre Ouest Est Sud	Tallage Tallage Tallage - Montaison	Ver blanc Taupins Fusariose Mauvaises herbes Septoriose Taches auréolées Rhynchosporiose Oïdium	Mauvaises herbes Septoriose Tache auréolée Oïdium Rhynchosporiose Ver blanc Taupins	<ul style="list-style-type: none"> • Procéder dès lors au désherbage chimique • Traitement fongique contre les maladies foliaires signalées. • Surveillance du ver blanc, taupins et criocère et intervenir par un traitement localisé pour limiter la propagation. <i>(se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</i>
Pomme de terre de saison 	Centre Ouest Est	Levée à développement végétatif	Mildiou Alternaria	—	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance du mildiou et d'Alternaria • Traitement préventif contre le mildiou.

Spécifications	Régions	Stades phénologiques	Risques	Signalisations de la semaine	Recommandations
Tomate de plein champ 	Sud (Adrar, El Oued et Tamanrasset)	- 4 ^{ème} bouquet floral	Mildiou Botrytis Alternariose <i>Tuta absoluta</i> Aleurodes Thrips Pucerons Acariens	<i>Tuta absoluta</i> Botrytis Mildiou	<ul style="list-style-type: none"> Surveillance des maladies et ravageurs avec traitement selon le bioagresseur signalé. <p>(se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</p> <ul style="list-style-type: none"> Respect des mesures prophylactiques et l'entretien des pièges à phéromone destinés contre la mineuse. Aération des serres. Effeuilage. Eviter que les plantes touchent le sol. Elimination des mauvaises herbes.
Tomate sous serre 	Centre Est Ouest Sud	- 1 ^{er} à 9 ^{ème} bouquet floral			
Arbres fruitiers à noyaux (Pêcher et abricotier) 	Centre Est Ouest Sud	Débourrement à floraison (variétés précoces) Bourgeon d'hiver (variétés tardives)	Cloque Moniliose	—	<ul style="list-style-type: none"> Traitement d'hiver pour les variétés tardives Traitement préventif anti cloque et anti moniliose, pour les arbres (variétés précoces) n'ayant pas fait l'objet d'un traitement d'hiver.
Néflier 	Centre Est Ouest	Grossissement des fruits	Tavelure	Tavelure	<ul style="list-style-type: none"> Surveillance et traitement fongique si nécessaire.
Palmier Dattier 	Sud	- Repos végétatif	—	—	<ul style="list-style-type: none"> Application des mesures d'entretien et de nettoyage des palmeraies. Réalisation du traitement d'hiver.