

Avertissements Agricoles

التنبهات الزراعية

CERATITE DU PECHER «*Ceratitis capitata*»

Le réseau de surveillance de l'INPV continue d'enregistrer des captures importantes des adultes de la cératite sur les variétés tardives de pêchers (seuil de nuisibilité atteint), se trouvant actuellement au stade « **Véraison à maturation des fruits** » au niveau des wilayas de Blida, de Batna, d'El Tarf et de Tizi Ouzou.

Eu égard au stade réceptif des pêchers aux piqûres de cette mouche, les arboriculteurs sont conseillés de procéder à un traitement insecticide adéquat, afin d'assurer une protection efficace de leurs fruits et particulièrement en cette période où les conditions climatiques sont favorables à l'activité de cet insecte extrêmement nuisible.



NB :

- Il est conseillé d'appliquer un traitement partiel (une rangée sur deux) en associant à l'insecticide utilisé, un attractif alimentaire afin de préserver les insectes utiles existants au niveau des vergers (faune auxiliaire).
- Le traitement doit être renouvelé en fonction de la rémanence du produit tout en respectant le **Délai Avant Récolte (DAR)**.

Alertes agricoles

التنبهات الزراعية

ذبابة الفواكه على الخوخ

تستمر شبكة مراقبة ذبابة الفواكه عبر مراكز المعهد بتسجيل نسب اصطياذ كبيرة لهذه الحشرة و التي فاقت عتبة التدخل، على الاصناف المتأخرة للخوخ في كل من ولايات البليدة، باتنة، الطارف و تيزي وزو.

ملاحظة

- يستحسن تطبيق علاج جزئي (صف على صفيين) باستعمال مييد حشري ملائم ممزوج بجاذب غذائي للحفاظ على الحشرات النافعة الموجودة في البساتين.
- من أجل حماية ناجعة للثمار، يستحسن إعادة المعالجة حسب مدة فعالية المييد مع احترام الفترة ما قبل الجني.

نظرا لطورقابلية فواكه الخوخ للإصابة بلسعات هذه الذبابة، ندعو الفلاحين المعنيين بالقيام بالمعالجة الملائمة لهدف حماية الفواكه و خاصة خلال هذه الفترة أين الظروف المناخية جد ملائمة لنشاط هذه الحشرة الخطيرة.

