



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE

وزارة الفلاحة
والتربية الريفية والصيد البحري

INSTITUT NATIONAL DE LA
PROTECTION DES VÉGÉTAUX

التنبهات الزراعية Avertissements agricoles

المعهد الوطني لوقاية النباتات

INPV, 12 Avenue des Frères Ouadek
Hassen Badi - BP 80 El-Harrach Alger

مركز 12 نهج الأخوة وأدك حسن
بلدي - ص ب 80 الحراش - الجزائر

DÉPARTEMENT D'APPUI TECHNIQUE

☎ : 023.82.88.86
☎ : 023.82.88.96
@ : impv@wissal.dz

دائرة الدعم التقني

☎ : 023.82.88.86
☎ : 023.82.88.96



CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES « 2^{ème} AVIS »

15/05/2017

Des captures d'adultes du carpocapse ont été enregistrées grâce au système de piégeage de l'INPV, durant cette période caractérisée par des conditions climatiques propices à l'activité de ce papillon au niveau des zones de production des pommes et des poires relevant de l'Est, de l'Ouest et du Centre du pays.

La ponte pouvant avoir lieu peu de temps après l'accouplement, une attaque pourrait se produire dans les prochains jours.

A cet effet, il est vivement recommandé aux arboriculteurs d'entreprendre, dès maintenant, un traitement insecticide spécifique (selon le stade biologique dominant) et homologué à cet usage afin de protéger la récolte des préjudices qui peuvent être causés par les chenilles de ce redoutable ravageur.

NB : Une deuxième application après 15 à 20 jours s'avère nécessaire pour couvrir tous les individus issus de la première génération.

Pour plus d'informations, veuillez-vous rapprocher des services phytosanitaires régionaux



التنبهات الزراعية Avertissements agricoles

المعهد الوطني لوقاية النباتات
م. و. و. 12 نهج الأخوة وادك حسن
ب. و. - ص. ب. 80 الحراش - الجزائر

DEPARTEMENT D'APPUI TECHNIQUE

☎ : 023.82.88.86
☎ : 023.82.88.96
@ : impv@wissal.dz



دائرة الدعم التقني

☎ : 023.82.88.86
☎ : 023.82.88.96

دودة التفاح والاجاص

2017/05/15

سجلت شبكة المراقبة عن طريق المصائد الخاصة بدودة التفاح (كاربوكابس)، نسب اصطياد الحشرات البالغة مناسبة لحد التدخل خلال هذه الفترة المتميزة بظروف مناخية ملائمة لنشاط هذه الفراشة في عدة مناطق لولايات الشرق، الغرب ووسط البلاد. بعد عملية التزاوج، يمكن وضع البيض بعد فترة وجيزة و قد يحدث هجوم لليرقات الناتجة خلال الأيام القادمة.

لهذا الغرض، ندعو أصحاب الأشجار المثمرة بالعلاج في اقرب الآجال باستعمال مبيد حشري ملائم (حسب الطور البيولوجي السائد) و مرخص لهدف حماية المنتج من الخسائر التي يمكن ان تحدثها يرقات هذه الحشرة الخطيرة.

ملاحظة يستحسن اعادة المعالجة 15 يوم بعد المعالجة الاولى لتغطية جميع افراد الجيل الاول.

و للمزيد من المعلومات، يرجى التقرب من مصالح الصحة النباتية القريبة منكم.