



Avertissements agricoles

التنبيهات الزراعية

CERATITE DES AGRUMES « 2^{ème} AVIS »

09/10/2018

Le seuil de nuisibilité de la cératite est largement atteint dans pratiquement toutes les wilayas du Nord, à travers les sites faisant l'objet de pose de pièges à phéromones sexuelles.

Dans ce contexte et compte tenu du stade sensible des agrumes et les conditions climatiques favorables à l'activité de cet insecte, il est fort recommandé aux agrumiculteurs de procéder et/ou de renouveler le traitement insecticide par l'utilisation d'un produit spécifique et homologué à cet usage afin de prémunir les fruits des piqûres de cette redoutable mouche.

TRES IMPORTANT

Méthodes à appliquer : Additionner à l'insecticide sélectionné contre la cératite, un attractif alimentaire à base d'hydrolysate de protéine et pulvériser soit :

- ↪ Un côté de chaque rangée des arbres seulement.
- ↪ Une rangée sur deux.

Cette méthode permet de préserver les insectes utiles existant au niveau des vergers (faune auxiliaire).



NB : Durant cette période, les variétés semi-précoces et tardives ne sont pas concernées par ce traitement (stade sensible non encore atteint).



Avertissements agricoles

التنبهات الزراعية

2018/10/09

ذبابة الفواكه "الانذار الثاني"

تم تسجيل عتبة الضرر لذبابة الفواكه في جميع ولايات الشمال على مستوى المواقع التي وضعت فيها المصائد المجهزة بالفيرومونات الجنسية الخاصة بهذه الحشرة.

في هذا السياق ومع الاخذ بعين الاعتبار قابلية الحمضيات للسعات هذه الذبابة و الظروف المناخية الملائمة لنشاطها، نوصى الفلاحين بالقيام او بإعادة المعالجة الكيميائية باستعمال مبيد مخصص و مرخص لهدف حماية الفواكه من لسعات هذه الحشرة.

هام جدا



الطرق التي يستحسن تطبيقها : أضف إلى المبيد الحشري المختار ضد هذه الذبابة، جاذب غذائي "هيدروليزات البروتين" ، و القيام إما :

➔ برش جانب واحد من الأشجار فقط.

➔ برش صف واحد على اثنين.

تسمح هذه الطريقة بالحفاظ على الحشرات النافعة الموجودة في البساتين.



ملاحظة: خلال هذه الفترة، الأنواع شبه المبكرة والمتأخرة غير معنية بهذه المعالجة نظرا لعدم بلوغها الطور الحساس.